

結核予防法 改正

赤ちゃんのツベルクリンが廃止され、 BCG予防接種の 接種期間が短くなります！

これまでのBCG

● 4歳までの者のうちツベルクリン反応が陰性の者（結核に感染していない者）に対して実施

ツベルクリン反応検査で発見される乳幼児の結核感染者は非常に少なかった。

● ツベルクリン反応検査による患者発見率の低さや、早期接種の重要性により見直しを検討

平成17年 4月からのBCG

● ツベルクリン反応検査を廃止して、BCG接種を生後6カ月に達するまでに実施

※ただし、地理的条件や交通事情、災害の発生などの特別の事情によりやむ

を得ない時は、1歳に達するまでの期間となります。また、開始時期については免疫不全症の可能性を鑑み、生後3カ月から接種が望ましいと考えられます。

BCGなぜ…

BCGは毒性を弱めた牛型の結核菌で作ったワクチンで、結核の免疫をつけるために接種します。BCGの効果は15年程度持続するといわれ、重症の結核の予防に高い有効性が認められています。2年前には、小中学校のツベルクリン・BCGが共に廃止されており、BCG接種を受ける機会は乳児期の1回のみとなっています。抵抗力の弱い乳児の結核は重症化しやすく、死にいたるケース

赤ちゃんの周りの人の 結核にご注意！

乳幼児の結核のほとんどが家族からの感染によるものです。BCG接種により結核を予防することに加えて、周囲の人に結核にかかっている人がいないか常に気をつけることが大切です。

結核の初期症状は風邪にそっくりなため見逃すことが多いです。「風邪かな？」と思っても症状が長引くようなら結核を疑い、早めに医療機関を受診しましょう。

もありませんので、BCG接種をできるだけ早い時期に、確実に実施する必要があります。



平成17年度 調理師試験のご案内

願書受付期間／平成17年5月30日～6月3日

受験資格／義務教育を受けた者で、多人数に対して飲食物を提供する学校・病院等の施設または、食品衛生法に規定される飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業において平成17年6月3日までに2年以上の調理の業務に従事した者。

手数料／6,700円（北海道収入証紙により納付）

試験期日等／平成17年8月23日(火) 稚内市で実施されます。



願書用紙や提出書類に関するお問い合わせは

留萌保健福祉事務所保健福祉部
子ども・保健推進課 保健予防係
☎0164-42-1511（内線3642）

留萌保健福祉事務所天塩支所
調整係

☎2-1179